

12 gennaio 2026 – 16 gennaio 2026

N° 55 - InFarmaco newsletter

Nell'anziano ridurre il rischio di cadute partendo dai farmaci è possibile

Nel nuovo *Minidossier* di COSIsiFA parliamo di farmaci e rischio di cadute, dai medicinali maggiormente coinvolti alle strategie attuabili per ridurre il pericolo.

L'integrazione di vitamina D negli anziani non è sempre appropriata

Negli anziani con multimorbilità e in polifarmacoterapia, la vitamina D è spesso assunta in modo inappropriato.

Una vitamina per i tumori della pelle

La nicotinamide riduce il rischio di tumori basocellulari e squamocellulari della cute, ma va riservata a chi ha già avuto tumori di questo tipo.

Gli antibiotici possono bastare in caso di ascesso a seguito di una tonsillite

La terapia antibiotica può essere considerata il primo passo per il trattamento dell'ascesso peritonsillare, purché si tenga sotto stretto controllo la situazione clinica.

Profilassi antibiotica: sì o no nelle infezioni ricorrenti delle vie urinarie?

Gli antibiotici sono normalmente prescritti per la prevenzione delle infezioni ricorrenti delle vie urinarie, ma ciò aumenta il rischio di resistenze batteriche.