

12 gennaio 2026 – 16 gennaio 2026

## N° 55 - InFarmaco newsletter

### **Nell'anziano ridurre il rischio di cadute partendo dai farmaci è possibile**

Nel nuovo *Minidossier* di COSIsiFA parliamo di farmaci e rischio di cadute, dai medicinali maggiormente coinvolti alle strategie attuabili per ridurre il pericolo.

---

### **L'integrazione di vitamina D negli anziani non è sempre appropriata**

Negli anziani con multimorbilità e in polifarmacoterapia, la vitamina D è spesso assunta in modo inappropriato.

---

### **Una vitamina per i tumori della pelle**

La nicotinamide riduce il rischio di tumori basocellulari e squamocellulari della cute, ma va riservata a chi ha già avuto tumori di questo tipo.

---

### **Gli antibiotici possono bastare in caso di ascesso a seguito di una tonsillite**

La terapia antibiotica può essere considerata il primo passo per il trattamento dell'ascesso peritonsillare, purché si tenga sotto stretto controllo la situazione clinica.

---

## La profilassi antibiotica non è sempre l'ideale

Gli antibiotici sono normalmente prescritti per la prevenzione delle infezioni ricorrenti delle vie urinarie, ma ciò aumenta il rischio di resistenze batteriche.